

Feuille de renseignements pour les patients

Traitement par remdésivir : à domicile

Les renseignements ci-dessous s'adressent aux patients qui recevront un traitement par remdésivir à domicile.

1) Qu'est-ce que le remdésivir et comment peut-il aider?

Le remdésivir est un médicament intraveineux administré aux personnes âgées de 18 ans ou plus atteintes de la COVID-19 qui courent un risque élevé d'hospitalisation en raison de leur âge ou de leur état de santé. Le remdésivir aide le corps à combattre l'infection pour que le patient puisse se rétablir plus rapidement, réduisant ainsi le risque d'hospitalisation.

Le remdésivir ne prévient pas la COVID-19. La vaccination demeure la meilleure option pour réduire le risque de graves problèmes de santé liés au virus.

2) Quels sont les effets secondaires possibles du remdésivir?

Les effets secondaires pourraient inclure ce qui suit :

a) **Perfusion intraveineuse** : bleuissement de la peau, douleur, enflure, rougeur au point d'injection.

b) **Remdésivir** : diarrhée ou réactions allergiques, y compris :

Fièvre, frissons, nausée, sentiment d'être malade, mal de tête, difficulté à respirer, serrement de la poitrine, chute ou hausse de la tension artérielle, enflure du visage, irritation de la gorge, éruption cutanée accompagnée d'urticaire, démangeaisons ou éruption cutanée qui démange, douleur musculaire, rythme cardiaque irrégulier, transpiration accrue, étourdissements ou sensation de tête légère.

En cas de réaction indésirable, un adulte capable (18 ans ou plus) doit être présent à la maison ou près du patient pendant **six heures après l'administration du médicament**.

**** Si les effets s'aggravent**, appelez le 911 rendez-vous au service des urgences le plus près. ******

3) Comment dois-je me préparer au traitement?

Lorsque l'infirmière vient chez vous pour administrer le traitement, veuillez suivre les directives ci-dessous :

a) **Portez un masque médical durant la visite, si possible**. L'infirmière peut vous en donner un, au besoin.

b) Demandez à toute autre personne qui sera présente durant la visite de **se tenir à une distance de deux mètres et de porter un masque médical**, si possible.

c) **Suivez les instructions détaillées de l'infirmière** pour recevoir des soins à domicile.

d) Comme indiqué plus haut, **en cas de réaction indésirable**, un adulte capable doit être présent à la maison ou près du patient **pendant six heures après l'administration du traitement**.

4) Questions ou préoccupations? Veuillez appeler votre coordonnateur de soins en composant sa ligne directe ou le 310-2222 (indicatif régional non requis).